

## Hinweise zur Hepatitis A-Impfung vor Reisen

Zum Schutz gegen die durch das Hepatitis A-Virus verursachte Leberinfektion ist eine aktive Immunisierung möglich.

Spätestens 14 Tage vor Reisebeginn sollte eine Impfung mit dem Hepatitis-A-Impfstoff erfolgen. Die Wirkung hält ca. 6-12 Monate an.

Zur Aufrechterhaltung eines langfristigen (10 Jahre oder mehr) Impfschutzes ist eine 2. Impfung nach ca. 6 Monaten erforderlich, die bei nicht weiter bestehender beruflicher Gefährdung auf eigene Kosten beim Hausarzt durchgeführt werden kann.

Gegebenfalls übernehmen auch die Krankenkassen die Kosten für diese 2. Impfung; bitte dort nachfragen.

**Nicht geimpft** wird bei Vorliegen eines akuten (fiebrigen) Infekts, bei schwerer Eiweißallergie, in der Schwangerschaft oder während einer Cortisontherapie.

**Als Nebenwirkung** kann es zu vorübergehendem Druckschmerz ("Muskelkater" an der Injektionsstelle) kommen. Weitere harmlose Nebenwirkungen wie Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Unwohlsein und leichtes Fieber sind bei ca. 5% der Geimpften möglich. Wie bei allen Impfstoffen besteht das äußerst geringe Risiko einer schwerwiegenden allergischen Reaktion. In Einzelfällen wurde nach der Impfung über Lähmungserscheinungen und Nervenentzündungen berichtet, ohne daß ein kausaler Zusammenhang bewiesen werden konnte.